



Gebrauchsinformation

Bezeichnung des Arzneimittels:

Prazimed

Arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge: 1 ml enthält: 40 mg Praziquantel

Darreichungsform: Lösung zum Zusetzen zum Aquarienwasser

Pharmazeutischer Hersteller:

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, D-48291 Telgte

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dohse Aquaristik KG, D-53501 Gelsdorf

Gebindegröße: 25 ml für 500 l Aquarienwasser

Anwendungsgebiete: Arzneimittel gegen Hautwürmer (Gyrodactylus), Kiemenwürmer (Dactylogyrus) und Bandwürmer (Cestoden).

Symptome: Hautwürmer: Scheuerverhalten entlang von Einrichtungsgegenständen des Aquariums, Schwanzflosse wird eingeklemmt gehalten. Kiemenwürmer: Erhöhte Atemfrequenz. Bandwürmer: Fische magern trotz normalem Fressverhalten rapide ab.

Hinweis: Biologische Filter brauchen nicht abgeschaltet werden. Während der Behandlung UV-Klärer abschalten und nicht über Kohle filtern. Im Falle einer ungewollten Überdosierung oder auftretender Trübung 50 % des Wasser wechseln. Für ausreichende Sauerstoffzufuhr sorgen.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung:

a) bei Haut- und Bandwürmern:

1. Tag: Vor der Behandlung sind $\frac{3}{4}$ des Aquarienwassers zu wechseln. Die berechnete Menge Prazimed (5 ml, d.h. 100 Tropfen auf 100 l Aquarienwasser) beim Zugeben ins Aquarium vorsichtig umrühren, damit der Wirkstoff gleichmäßig verteilt wird. Nach 6 Stunden müssen mindestens $\frac{3}{4}$ des Aquarienwassers gewechselt werden.

2. Tag: 50 % des Wassers wechseln.

b) bei Kiemenwürmern:

Da die Eier der Kiemenwürmer bei der Erstbehandlung nicht erreicht werden, ist die Behandlung noch zwei Mal im Abstand von je 7 Tagen bei Warmwasser- und 10 Tagen bei Kaltwasserfischen zu wiederholen. Dabei werden die zwischenzeitlich geschlüpften Würmer erfasst.

c) im Meerwasseraquarium:

Dosierung 6 ml auf 100 l Aquarienwasser.

d) zur Vorbeugung:

Neu erworbene Fische und Wasserpflanzen sollten unter ausreichender Belüftung mit einem Ausströmer 20 Minuten mit doppelter Dosis mit Prazimed behandelt werden.

Warnhinweis: Empfindliche Arten Wirbellose (Garnelen, Muscheln oder Schnecken) vertragen eine Behandlung mit Prazimed meist nicht.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Der gleichzeitige Gebrauch von Wasseraufbereitungsmitteln kann die Wirkung von Prazimed verringern. Prazimed darf nicht gleichzeitig mit anderen Mitteln angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt

Gegenanzeigen: Keine bekannt

Sicherheitshinweis: Arzneimittel für Tiere: Zierfische. Nicht bei Tieren anwenden die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Vor Licht und Hitze geschützt bei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Datum der Fassung der Gebrauchsanweisung: 2007-05-01



Istruzioni per l'uso

Denominazione del prodotto:

Prazimed

Composizione: 1 ml contiene: 40 mg praziquantel

Forma farmaceutica: di soluzione da sciogliere nell'acqua dell'acquario

Produttore farmaceutica: Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, D-48291 Telgte

Titolare farmaceutica: Dohse Aquaristik KG, D-53501 Gelsdorf

Dosaggio: 25 ml per 500 l d'acqua

Indicazioni: Presidio medico contro i vermi della pelle (*Gyrodactylus*), vermi delle branchie (*Dactylogyrus*) e vermi piatti (*Cestoden*).

Sintomi: vermi della pelle: strofinamento sulle superfici degli oggetti dell'allestimento dell'acquario, la pinna caudale viene tenuta in posizione schiacciata. Vermi delle branchie: elevata frequenza respiratoria. Vermi piatti: i pesci dimagriscono rapidamente nonostante la normale alimentazione.

Nota: i filtri biologici non devono essere disattivati. Disattivare durante il trattamento chiarificatore ultravioletto e non filtrare con carbone. In caso di un sovradosaggio indesiderato o la manifestazione di un intorbidimento cambiare il 50 % dell'acqua. Garantire un sufficiente apporto di ossigeno.

Dosaggio e somministrazione:

a) in presenza di vermi della pelle e piatti

1° giorno: prima del trattamento è necessario cambiare i $\frac{3}{4}$ dell'acqua dell'acquario. Miscelare con attenzione la quantità calcolata di Prazimed (5 ml, cioè 100 gocce per 100 l di acqua dell'acquario) versandola nell'acquario per consentire una distribuzione uniforme del principio attivo. Dopo 6 ore è necessario cambiare almeno i $\frac{3}{4}$ dell'acqua dell'acquario.

2° giorno: cambiare il 50 % dell'acqua.

b) in presenza di vermi delle branchie

Dato che le uova dei vermi della pelle non sono raggiunti con il primo trattamento, è necessario ripetere il trattamento ancora due volte a distanza di 7 giorni per i pesci d'acqua calda e 10 giorni per i pesci d'acqua fredda. Con questa operazione si vanno a colpire i vermi che hanno effettuato la schiusa.

c) nell'acquario con acqua di mare

Dosaggio 6 ml per 100 l dell'acqua degli acquari.

d) per le operazioni di prevenzione

I pesci e le piante acquatiche appena acquistati dovrebbero essere sottoposti ad un trattamento con ossigenazione sufficiente con una pietra porosa per 20 minuti a doppia dose di Prazimed.

Avviso: Nella maggior parte dei casi le specie sensibili di invertebrati (gamberetti, mitilli o lumache) non tollerano un trattamento con Prazimed.

Interazioni: L'impiego del prodotto in concomitanza preparati per il trattamento dell'acqua può ridurre l'efficacia di Prazimed. Prazimed non deve pertanto essere somministrato insieme ad altri preparati.

Effetti collaterali: non sono effetti collaterali

Controindicazioni: non sono note controindicazioni

Indicazione di sicurezza: presidio medico per pesci da acquario. Non utilizzare su animali destinati all'uso alimentare. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Conservare in un luogo protetto dalla luce e dal calore. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Ultima revisione del foglio illustrativo: 2007-05-01